

《藥劑業及毒藥條例》

---

**決議**

(根據《藥劑業及毒藥條例》(第138章)第29條)

---

議決批准藥劑業及毒藥管理局於 2002 年 5 月 28 日訂立的 —

- (a) 《2002 年藥劑業及毒藥(修訂)(第 2 號)規例》；及
- (b) 《2002 年毒藥表(修訂)(第 2 號)規例》。

## 《2002 年藥劑業及毒藥(修訂)(第 2 號)規例》

(由藥劑業及毒藥管理局根據《藥劑業及毒藥條例》  
(第 138 章)第 29 條訂立，並經立法會批准)

### 1. 特別限制根據第 3 及 5 條適用 在毒藥表範圍內的物質

《藥劑業及毒藥規例》(第 138 章，附屬法例)附表 1 的 A 部分現予修訂，  
加入 —

“加尼瑞克；其鹽類  
卡泊芬淨；其鹽類  
去鐵酮；其鹽類”。

### 2. 獲第 8 條豁免受本條例及本規例 條文規限的物品

附表 2 第 II 組的 A 部分現予修訂，在與“具有雄激素或雌激素或孕激素作用的類固醇化合物；它們的酯類”有關的記項中，廢除“擬只作避孕用的含有不多於 50 微克雌激素物質及不多於 5 毫克孕激素物質的口服製劑；每”而代以 —

“擬只作避孕用而每劑含有不多於以下分量的物質的口服製劑 —

- 0.10 毫克孕二烯酮；
- 0.25 毫克左炔諾孕酮；
- 0.15 毫克去氧孕烯；
- 2.50 毫克利奈孕酮；
- 0.05 毫克炔雌醇；
- 0.50 毫克炔諾孕酮；
- 1.00 毫克炔諾酮；
- 3.00 毫克屈螺酮；

0.05 毫克美雌醇；及  
0.25 毫克諾孕酯，  
每”。

**3. 第 9 條規定僅可按照註冊醫生、註冊牙醫或註冊獸醫開出的處方而以零售方式銷售的物質**

附表 3 的 A 部分現予修訂，加入 —

“加尼瑞克；其鹽類  
卡泊芬淨；其鹽類  
去鐵酮；其鹽類”。

(林秉恩醫生)  
藥劑業及毒藥管理局  
主席

2002 年 5 月 28 日

**註釋**

本規例更新《藥劑業及毒藥規例》(第 138 章，附屬法例)附表 1、2 及 3，  
以 —

- (a) 分別在附表 1 及 3 中加入 3 種新的物質(第 1 及 3 條)；及
- (b) 對含有雌激素物質及孕激素物質的口服避孕產品加強管制(第 2 條)。

## 《2002年毒藥表(修訂)(第2號)規例》

(由藥劑業及毒藥管理局根據《藥劑業及毒藥條例》  
(第138章)第29條訂立，並經立法會批准)

### 1. 毒藥表

《毒藥表規例》(第138章，附屬法例)的附表現予修訂，在第I部的A部分中，加入 —

“加尼瑞克；其鹽類  
卡泊芬淨；其鹽類  
去鐵酮；其鹽類”。

(林秉恩醫生)  
藥劑業及毒藥管理局  
主席

2002年5月28日

### 註釋

本規例更新《毒藥表規例》(第138章，附屬法例)的附表，在毒藥表的第I部的A部分中加入3種物質。

**Poisons List (Amendment) (No. 2) Regulation 2002**

**Pharmacy and Poisons (Amendment) (No. 2) Regulation 2002**

**Supplementary Information to the Legislative Council**

《2002年毒藥表（修訂）（第 2 號）規例》  
《2002年藥劑業及毒藥（修訂）（第 2 號）規例》  
提交立法會的補充資料

<b>Drug Name</b> 藥名	<b>Proposed Classification</b> 建議類別	<b>Reason</b> 原因
<b>Caspofungin</b> 卡泊芬淨	Part I, First and Third Schedules poison 第一部附表一及附表三毒藥	<p>This medicine is used for the treatment of invasive aspergillosis in patients who do not respond to other therapies. A doctor's decision is required for the use of this medicine.</p> <p>此藥用作治療對其它療法無療效之侵襲性曲菌病。選用此藥需經醫生決定。</p>
<b>Deferiprone</b> 去鐵酮	Part I, First and Third Schedules poison 第一部附表一及附表三毒藥	<p>This medicine is used for the treatment of iron overload in patients with thalassemia-major whom deferoxamine therapy is inadequate. This drug should only be used upon medical judgment on appropriate usage.</p> <p>此藥用於治療去鐵胺未有足夠療效之重型地中海貧血引致的鐵質過量症。需經醫生清楚診斷適用時，才能使用此藥物。</p>

<b>Drug Name</b> <b>藥名</b>	<b>Proposed Classification</b> <b>建議類別</b>	<b>Reason</b> <b>原因</b>
<b>Ganirelix</b> 加尼瑞克	Part I, First and Third Schedules poison 第一部附表一及附表三毒藥	<p>This medicine is used to prevent premature luteinising hormone surges in women undergoing controlled ovarian hyperstimulation for assisted reproduction techniques. A doctor's decision is required for the use of this medicine.</p> <p>此藥用作預防女性進行輔助生育技術中，控制性高度刺激卵巢所引致的黃體激素過早急劇分泌。選用此藥需經醫生決定。</p>