

立法會

Legislative Council

立法會 CB(3)497/04-05 號文件

檔 號 : CB(3)/M/OR
電 話 : 2869 9205
日 期 : 2005 年 4 月 14 日
發 文 者 : 立法會秘書
受 文 者 : 立法會全體議員

2005 年 5 月 4 日
立法會會議

根據《藥劑業及毒藥條例》 動議的決議案

衛生福利及食物局局長會在 2005 年 5 月 4 日舉行的立法會會議上，根據《藥劑業及毒藥條例》就：

- (a) 《2005 年藥劑業及毒藥（修訂）規例》；及
- (b) 《2005 年毒藥表（修訂）規例》

動議一項決議案。現謹附上有關決議案，供議員考慮。立法會主席已指示應“按所交來的原有措辭印載”在立法會議程上。

2. 局長在動議上述決議案時將會發表的演辭的中英文本，以及局長提交的補充資料，亦一併附上。

立法會秘書

（陳欽茂代行）

連附件

《 藥劑業及毒藥條例 》

決議

(根據《 藥劑業及毒藥條例 》(第 138 章)第 29 條)

議決批准藥劑業及毒藥管理局於 2005 年 4 月 9 日訂立的 —

- (a) 《 2005 年藥劑業及毒藥(修訂)規例 》；及
- (b) 《 2005 年毒藥表(修訂)規例 》。

《 2005 年藥劑業及毒藥(修訂)規例 》

(由藥劑業及毒藥管理局根據《 藥劑業及毒藥條例 》(第 138 章)
第 29 條在須經立法會批准的規限下訂立)

1. 特別限制根據第 3 及 5 條適用的屬 毒藥表範圍內的物質

《 藥劑業及毒藥規例 》(第 138 章，附屬法例 A)附表 1 的 A 部分現予修訂，加入 —

“西妥昔單抗
托莫西汀；其鹽類
阿立哌唑
培美曲塞；其鹽類；其酯類；它們的鹽類
硼替左米
煙酸；其鹽類；只在包含於藥劑製品內並且該等製品的建議每日劑
量含超過 200 毫克煙酸時”。

2. 第 9 條規定僅可按照註冊醫生、註冊 牙醫或註冊獸醫開出的處方而以 零售方式銷售的物質

附表 3 的 A 部分現予修訂，加入 —

“西妥昔單抗
托莫西汀；其鹽類
阿立哌唑
培美曲塞；其鹽類；其酯類；它們的鹽類
硼替左米
煙酸；其鹽類；只在包含於藥劑製品內並且該等製品的建議每日劑
量含超過 200 毫克煙酸時”。

藥劑業及毒藥管理局
主席

2005 年 4 月 9 日

註釋

本規例在《藥劑業及毒藥規例》(第 138 章，附屬法例 A)附表 1 及 3 中各自加入 6 種物質，使該 6 種物質的銷售及貯存均受《藥劑業及毒藥條例》(第 138 章)及該規例施加的限制所規限。(在該 6 種物質中，煙酸及其鹽類只有在包含於藥劑製品內並且該等製品的建議每日劑量含超過 200 毫克煙酸時才受該等限制所規限。)

《 2005 年毒藥表 (修訂) 規例 》

(由藥劑業及毒藥管理局根據《藥劑業及毒藥條例》(第 138 章)
第 29 條在須經立法會批准的規限下訂立)

1. 毒藥表

《毒藥表規例》(第 138 章，附屬法例 B)的附表現予修訂，在第 I 部的 A 部分中，加入 —

“西妥昔單抗

托莫西汀；其鹽類

阿立哌唑

培美曲塞；其鹽類；其酯類；它們的鹽類

硼替左米

煙酸；其鹽類；只在包含於藥劑製品內並且該等製品的建議每日劑量含超過 200 毫克煙酸時”。

藥劑業及毒藥管理局
主席

2005 年 4 月 9 日

註釋

本規例在《毒藥表規例》(第 138 章，附屬法例 B)的附表所列的毒藥表的第 I 部的 A 部分中加入 6 種物質。該部分所列的毒藥基本上是作醫藥用途的。《藥劑業及毒藥條例》(第 138 章)規定該等毒藥只可在已根據該條例註冊的處所內由註冊藥劑師或在其在場監督的情況下銷售。

Poisons List (Amendment) Regulation 2005

Pharmacy and Poisons (Amendment) Regulation 2005

Supplementary Information to the Legislative Council

《 2005年毒藥表（修訂）規例 》
《 2005年藥劑業及毒藥（修訂）規例 》
提交立法會的補充資料

Drug Name 藥名	Proposed Classification 建議類別	Reason 原因
Aripiprazole (阿立哌唑)	Part I, First and Third Schedules poison 第一部附表一及附表三毒藥	<p>This drug is used for the treatment of schizophrenia. It should only be used after the need is established by a medical diagnosis. Patients with established diabetes or risk for diabetes should be monitored.</p> <p>此藥用於治療精神分裂症。此藥需經醫生確診後，決定有需要時才使用。有糖尿病或有糖尿病風險的病人，用此藥時需要醫生觀察病人。</p>

Drug Name 藥名	Proposed Classification 建議類別	Reason 原因
Atomoxetine; its salts (托莫西汀; 其鹽類)	Part I, First and Third Schedules poison 第一部附表一及附表三毒藥	<p>This drug is used for the treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) in children 6 years of age and older. Monitoring is required during its administration and its use should be decided by a doctor when the need is confirmed.</p> <p>此藥用於治療六歲以上兒童之過度活躍症。服用此藥需由醫生觀察病人而選用此藥應由醫生決定有需要時才使用。</p>
Bortezomib (硼替左米)	Part I, First and Third Schedules poison 第一部附表一及附表三毒藥	<p>This drug is used for treatment of myeloma (malignancy of bone marrow). A doctor's decision is required as to whether or not this medicine should be used after proper diagnosis. Medical monitoring is also required during administration.</p> <p>此藥用於治療骨髓瘤。此藥需經醫生確診後,決定有需要時才使用。用此藥時亦需要醫生小心觀察病人。</p>

Drug Name 藥名	Proposed Classification 建議類別	Reason 原因
Cetuximab (西妥昔单抗)	Part I, First and Third Schedules poison 第一部附表一及附表三毒藥	This drug is used as a second line treatment for metastatic colorectal cancer. A doctor's decision is required for whether or not to use this medicine. 此藥用於擴散性結腸/直腸癌的第二線治療。此藥需由醫生決定有需要時才使用。
Nicotinic acid; its salts; when contained in pharmaceutical products and with a recommended daily dose exceeding 200mg of nicotinic acid. (煙酸;其鹽類; 當載於藥劑製品及其每日建議用量超過200毫克煙酸時)	Part I, First and Third Schedules poison 第一部附表一及附表三毒藥	This drug is used for the treatment of high blood cholesterol and lipid levels. The need to use this drug should be established by medical diagnosis and monitoring of patients is required during administration. 此藥用於治療高膽固醇及高血脂症。此藥應經醫生診斷有需要時，才能使用。而病人亦需於用藥時接受觀察。

Drug Name 藥名	Proposed Classification 建議類別	Reason 原因
Pemetrexed; its salts; its esters; their salts (培美曲塞; 其鹽類; 其酯類; 它們的鹽類)	Part I, First and Third Schedules poison 第一部附表一及附表三毒藥	<p>This drug is used for the treatment of tumour of the pleura and metastatic lung cancer. The need to use this drug should be established by medical diagnosis. Monitoring of blood count is required before and during treatment.</p> <p>此藥用於治療胸膜間皮瘤和擴散性肺癌。此藥需經醫生確診後，決定有需要時才用。病人服用此藥前或服藥期間需接受血细胞計數的監察。</p>