



香港善導會

The Society of Rehabilitation and Crime Prevention, Hong Kong

(本會為註冊有限公司 Incorporated with Limited Liability)

PATRON  
The Hon Chief Justice Geoffrey MA, *GBM*  
PRESIDENT  
Mr PANG Kin-kee, *SBS*  
CHAIRMAN  
The Hon Mr Justice Patrick LI  
CHIEF EXECUTIVE  
Mr Andy NG Wang-tsang

贊助人  
終審法院馬道立首席法官, *GBM*  
會長  
彭鍵基先生, *SBS*  
主席  
李瀚良法官  
總幹事  
吳宏增先生

本會支持香港吸煙與健康委員會之下列建議：

### 一、煙草產品上的煙害圖象警示

#### 建議

- 將煙害圖象警示的面積由最少佔煙包面積 50%擴大至最少 85%；
- 圖象警示的式樣數目由六個增加至十二個；
- 加上「半數煙民因煙草失去生命」的警示；
- 顯示戒煙熱線 – 1833183。

#### 理據

- 香港現時使用的六款煙害圖象警示最少佔煙包面積 50%，自 2007 年起沿用，警示作用逐漸消退。
- 研究證實煙害圖象警示可以有效減低吸煙的吸引力、提高戒煙意欲、預防青少年開始吸煙。將圖象警示面積擴大可以教育和提高吸煙人士和市民認識吸煙對健康的禍害，同時防止煙草商利用煙包作宣傳推廣。
- 其他國家已推行更嚴格及有效的措施規管煙草產品包裝。尼泊爾將圖象警示面積擴大至 90%、澳洲至 90%(正面)及 75%(背面)、泰國至 85%、烏拉圭至 80%。
- 澳洲於 2012 年 12 月起實施「全煙害警示包裝」，證實有效降低吸煙率。英國及愛爾蘭亦於 2015 年 3 月通過落實。有更多國家亦正考慮實施。
- 在第十六屆世界煙草與健康會議上，世界衛生組織總幹事陳馮富珍博士特別指出「全煙害警示包裝」的控煙成效，鼓勵其他國家於 2018 年前推行「全煙害警示包裝」或擴大圖象警示至煙包面積 85%。
- 增大煙害圖象警示並不會侵犯版權或商標。沒有研究證實會引致私煙問題或令私煙情況變得嚴重。

### 二、在隧道出入口範圍的巴士轉乘站實施禁煙規定

#### 建議

- 將以下隧道出入範圍的巴士轉乘站指定為禁煙區
  - 海底隧道
  - 獅子山隧道
  - 城門隧道
  - 東區海底隧道
  - 西區海底隧道
  - 大老山隧道
  - 大欖隧道
  - 青沙公路 (介乎沙田隧道與尖山隧道之間)



香港善導會

The Society of Rehabilitation and Crime Prevention, Hong Kong

(本會為註冊有限公司 Incorporated with Limited Liability)

PATRON  
The Hon Chief Justice Geoffrey MA, GBM  
PRESIDENT  
Mr PANG Kin-kee, SBS  
CHAIRMAN  
The Hon Mr Justice Patrick LI  
CHIEF EXECUTIVE  
Mr Andy NG Wang-tsang

贊助人  
終審法院馬道立首席法官, GBM  
會長  
彭鍵基先生, SBS  
主席  
李瀚良法官  
總幹事  
吳宏增先生

### 理據

- 保障市民免受二手煙的危害。隧道出入口人流密集，等候巴士的市民並不能採取有效措施阻隔二手煙。
- 不少市民建議擴大禁煙區，包括巴士站及繁忙街道等。
- 現時已有不少國家將公共交通公具輪候範圍列為禁煙，包括新加坡、北京、美國和澳洲部份州份等。

### 三、禁制電子煙

#### 建議

- 禁止電子煙的入口、製造、銷售、分發及宣傳。

#### 理據

- 電子煙推出多種設計和口味，吸引年輕人，成為他們吸食捲煙的門檻。電子煙外型與一般捲煙無異，而製造商往往以「感覺如同吸食真煙」作宣傳噱頭，變相鼓吹及正常化吸煙行為。
- 電子煙設計和營銷策略針對年輕人，年輕人使用電子煙的數目大幅上升，情況令人擔憂。根據美國疾病控制與預防中心的研究，美國中學生使用電子煙的人數在2013至2014增加了三倍。
- 現時並沒有詳盡的科學研究證明電子煙有效幫助戒煙。世界衛生組織對電子煙的逐漸流行表示關注，並指出電子煙並不屬於認可的戒煙方法。
- 大部份電子煙的包裝均沒有列明詳細成份，只著重標榜不同味道，並配以「不會上癮」、「幫助戒煙」、「已獲認證」及「環保」等字眼誤導消費者有關電子煙的安全性，吸引青少年使用。
- 研究發現電子煙含可對健康造危害的化學物質，在高溫下加熱及汽化後更有可能產生其他有害物質和致癌物，當中包括尼古丁、丙烯乙二醇、甘油、甲醛、乙醛、添味劑、添加劑、煙草特有亞硝胺和重金屬等。
- 香港大學公共衛生學院進行的中學生吸煙情況調查 2012/13 發現，電子煙使用者更可能會吸食捲煙、有較高的尼古丁依賴程度、較低可能戒煙及較大機會出現呼吸道症狀，如咳嗽及有痰。
- 更多有關電子煙禍害的研究或需時數十年，委員會希望在造成人命損失前，禁止這種危害公眾健康的產品。香港例子：政府於80年代無煙煙草產品未盛行時全面禁止，防患於未然，保障市民健康。現時無煙煙草於多個國家極為普及，當地政府立例規管遇上重重困難。
- 如電子煙用作戒煙用途，可規定必須向衛生署註冊，必須符合效能、安全及質素方面的準則，方可在香港出售。
- 現時全球已有最少13個國家全面禁止電子煙，當中包括新加坡、泰國、巴西等，可見此乃國際趨勢。